



# ПТИЦЫ

В ЭКСПОЗИЦИИ  
Природно-экологического музея  
Каталог





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛОЦКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

# ПТИЦЫ

**В ЭКСПОЗИЦИИ  
Природно-экологического музея**

Каталог

Печатается по решению научно-методического совета НПИКМЗ

Составитель: Иванец Н.Ф. –  
старший научный сотрудник

Фото: Бабко В.С. –  
старший научный сотрудник

Птицы. Каталог коллекции природно-экологического музея. –  
Полоцк: НПИКМЗ, 2007. – 109 с., іл.

Набор и макет выполнен на оборудовании  
научно-информационного отдела НПИКМЗ

Птицы – это поэзия и музыка живой природы. Высокая, чистая, удивительно многогранная, яркая, непредсказуемая. И всегда по-детски правдивая.

*И.И. Бышнев*

Данный каталог содержит информацию об орнитофауне Белоруссии, представленной в экспозиции природно-экологического музея города Полоцка. Он посвящен обширной и многообразной группе животных – птицам, роль которых в природе и жизни человека весьма значительна. Каталог предназначен для широкого круга посетителей, и, прежде всего тех, кто интересуется птицами, наблюдает, изучает и занимается их охраной.

Каталог поможет самостоятельно приобрести знания, поддерживать особый интерес посетителей к удивительному миру птиц и воспитывать бережное отношение человека к богатству природы.

В каталоге посетитель сможет найти достаточно разностороннюю информацию о внешнем виде, ареале обитания и образа жизни птиц.

Систематика птиц в каталоге представлена по отрядам, которые расположены в соответствии с общепринятой классификацией (отряд, класс, род, вид). Каждый отряд содержит перечень видов, расположенных в алфавитном порядке. Количество описанных видов 94.

Работу с каталогом облегчит «Указатель названий отрядов».



## Класс ПТИЦЫ – AVES

Птицы – это теплокровные позвоночные животные. Одними из наиболее характерных признаков птиц являются покров из перьев, прочный и легкий скелет, отсутствие зубов, повышенный обмен веществ и двойное дыхание.

Размножаются путем откладки яиц и им свойственна забота о потомстве.

Питаются разнообразной пищей. Птицы бывают растительноядные, зерноядные, насекомоядные, хищные.

На территории Беларуси обитает 305 видов птиц. 102 вида – живут в лесах, 61 вид – на болотах и берегах водоемов, 42 вида – гнездятся в полях, а остальные бывают пролетом весной и осенью.

Большинство из них полезны для человека: одни уничтожают вредителей (насекомых или грызунов), другие дают нам мясо, пух, яйца; третьи украшают леса и парки, оживляют их своим пением.

Птицы – неотъемлемая часть живой природы, важнейший биологический ресурс, поэтому их необходимо беречь и любить, а для этого, прежде всего, птиц надо знать.

# УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ОТРЯДОВ

Класс ПТИЦЫ – AVES

## Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ

Поганка большая (чомга)

## Отряд ВЕСЛОНОГИЕ

Баклан большой

## Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ (ГОЛЕНАСТЫЕ)

Аист белый  
Выпь большая  
Цапля серая

## Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Гоголь обыкновенный  
Гусь белолобый  
Гусь-гуменник  
Казарка белошекая  
Кряква обыкновенная  
Лебедь-шипун  
Связь  
Чирок-свиистунок  
Чирок-трескунок  
Шилохвость

## Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ

Канюк (сарыч)  
Кобчик  
Коршун черный  
Лунь болотный  
Лунь луговой  
Лунь полевой  
Осоед обыкновенный  
Перепелятник (малый ястреб)  
Подорлик малый  
Пустельга обыкновенная  
Скопа  
Тетеревятник (большой ястреб)  
Чеглок

## Отряд КУРООБРАЗНЫЕ

Глухарь  
Куропатка серая  
Рябчик  
Тетерев

## Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

Журавль серый  
Камышница  
Коростель  
Лысуха  
Пастушок водяной  
Погоньш (болотная курочка)  
Султанка

## Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ

Бекас  
Вальдшнеп  
Гаршнеп  
Дупель  
Клуша  
Крчка белокрылая  
Крчка малая  
Крчка речная  
Кроншнеп большой  
Ржанка золотистая  
Травник (красноножка)  
Улит большой  
Фифи  
Чайка озерная  
Чайка серебристая (хохотунья)  
Чайка сизая

## Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ

Голубь сизый

## Отряд СОВООБРАЗНЫЕ

Неясыть длиннохвостая  
Неясыть обыкновенная (серая)  
Сова болотная  
Сова ушастая  
Сыч домовый  
Сыч мохноногий  
Филин

## Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ

Удод

## Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Желна (дятел черный)  
Дятел большой пестрый  
Дятел малый пестрый

## Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

Воробей полевой  
Ворон  
Ворона серая  
Гаичка черноголовая  
Галка  
Грач  
Дрозд певчий  
Дрозд-рябинник  
Дрозд черный  
Дубонос обыкновенный  
Жаворонок полевой  
Жаворонок рогатый  
Зарянка  
Зеленушка  
Кедровка (ореховка)  
Королек желтоголовый  
Лазоревка  
Ласточка деревенская (касатка)  
Овсянка обыкновенная  
Пищуха обыкновенная  
Поползень  
Свиристель  
Синица большая  
Синица длиннохвостая  
Скворец  
Славка черноголовая  
Снегирь  
Соловей  
Сойка  
Сорока  
Сорокопут-жулан  
Сорокопут серый  
Чечетка  
Чиж  
Щегол

# Отряд Поганкообразные *Podicipediformes*

Водоплавающие птицы средних и мелких размеров с короткими крыльями и далеко отставленными назад лапами. Клюв острый, шиловидный. Каждый палец окаймлен плавательной перепонкой. Оперение жесткое и плотное. Обитатели пресных водоемов. Моногамы. В фауне Беларуси 5 видов. В Красную книгу занесен 1 вид.

# Отряд Поганкообразные Podicipediformes

Семейство Поганковые — Podicipedidae

Род Поганка — Podiceps

Вид **ПОГАНКА БОЛЬШАЯ** (ЧОМГА) — **PODICEPS CRISTATUS**

1 зал, витрина 3, 40

Внешний вид. Немного меньше домашней утки. На голове пышные черные и рыжие украшающие перья, образующие «воротник». Спина темная, брюшко и шея белые. Клюв красноватый. У молодых птиц «воротника» нет, клюв желто-зеленый.

Образ жизни. Населяет заросли озер и прудов. Гнездо держится на плаву либо опирается на дно водоема. Кладка состоит из 3-4 яиц. Питается рыбой, насекомыми, моллюсками. Перелетный вид. Обычный, наиболее многочисленный из всех видов поганок, широко распространенный на всей территории республики.

Зимует в Западной Европе, Индии, в Крыму, Закавказье.



# Отряд Веслоногие Steganopodes

Водоплавающие птицы средней и крупной величины с довольно длинной шеей и широкими, длинными крыльями. Все 4 пальца заключены в общую плавательную перепонку. Гнездятся колониально. Моногамы. Пеликан розовый, фламинго обыкновенный встречаются как случайно залетные виды.

## Отряд Веслоногие Steganopodes

Семейство Баклановые —Phalacrocoracidae

Род Баклан — Phalacrocorax

Вид **БАКЛАН БОЛЬШОЙ** — PHALACROCORAX CARBO

1 зал, витрина 4

Внешний вид. Величиной с домашнего гуся. Оперение густое, черное с бронзово-зеленоватым отливом сверху и синеватым снизу. Пятно у клюва желтое. Ноги короткие, отставленные далеко назад. Молодые птицы бурые со светлым брюхом.

Образ жизни. Населяет заросшие тростником и древесной растительностью берега рек и озер. Гнездится большими колониями часто совместно с цаплями. Гнездо строит на деревьях из сухих ветвей, травы. Кладка состоит из 4-6 яиц. Кормится рыбой, ныряя и преследуя добычу под водой. Перелетный вид. С 1986 года постоянный обитатель крупных озер и рек Беларуси.





# Отряд Аистообразные (Голенастые) Ciconiiformes (Gressores)

Птицы от очень крупных до средних размеров. Ноги, шея и клюв длинные, крылья тупые и широкие. Обитатели мелководий, болот и залитых водой тростников. Гнездятся как отдельными парами, так и колониями. Моногамы. В фауне Беларуси 9 видов. В Красную книгу занесено 5 видов.

## Отряд Аистообразные (Голенастые) Ciconiiformes (Gressores)

Семейство Аистовые – Ciconiidae

Род Аист – Ciconia

Вид **АИСТ БЕЛЫЙ** – CICONIA CICONIA

3 зал, витрина 18а

Внешний вид. Крупнее гуся. Оперение белое, маховые перья черные, ноги и клюв красные. Молодые птицы с черноватым клювом и желто-серыми ногами.

Образ жизни. Населяет открытые пространства, чаще вблизи водоемов или обширных болот. Излюбленными местами гнездования являются населенные пункты. Гнездо очень громоздкое из сучьев и веток. Кладка из 3-5 яиц. Питается лягушками, мышевидными грызунами, змеями, рыбой, саранчой. Вид перелетный, распространен по всей территории. Численность на гнездовании в Витебской области оценена в 2500-2600 пар.

Зимует в Африке, на юге Азии.





# Отряд Аистообразные (Голенастые) Ciconiiformes (Gressores)

Семейство Цаплевые — Ardeidae

Род Выпь — Botaurus

Вид **ВЫПЬ БОЛЬШАЯ** (ВОДЯНОЙ БЫК) — BOTAURUS STELLARIS

1 зал, витрина 38

3 зал, витрина 18

Внешний вид. Немного крупнее домашней утки. Сравнительно коротконогая цапля с длинным, массивным клювом, большой головой и толстой шеей. Окраска рыже-бурая с густым рисунком из поперечных и продольных темных пестрин. Ноги и клюв зеленовато-желтые.

Образ жизни. Населяет болота, берега рек и озер, заросших тростником. Весной характерен отрывистый, глухой и басистый звук. Гнездо строит на земле или на кочке, всегда в гуще зарослей. Кладка из 3-7 яиц. Питается рыбой, поедает в массе лягушек, головастики и водных беспозвоночных. Вид перелетный, распространен по всей территории, но неравномерно.

Зимует в Средиземноморье, в Восточной Африке.

♦ С 1993 года вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

● Места обнаружения  
□ Места обнаружения,  
требующие подтверждения



# Отряд Аистообразные (Голенастые) Ciconiiformes (Gressores)

Семейство Цаплевые – Ardeidae

Род Цапля – Ardea

Вид **ЦАПЛЯ СЕРАЯ** – ARDEA CINEREA

4 зал

Внешний вид. Чуть больше гуся. Окраска серая, хохол, концы крыльев и полоска на шее черные. Шея и брюшко белые. Клюв бурый. Ноги желто-бурые.

Образ жизни. Населяет места, где имеются хотя бы небольшие участки высокоствольного леса или обширные тростниковые заросли. Гнездится отдельными парами или колониями по рекам, озерам и водохранилищам. Гнездо строит на дереве или заломках тростника. Кладка из 4-5 яиц. Питается мелкой рыбой, насекомыми, лягушками и другими мелкими животными. Обычный на гнездовании перелетный вид, транзитный мигрант, редко остается зимовать. Распространен вид на всей территории, но чаще встречается в бассейне р. Припять и в Поозерье.

Зимует на юго-западе Европы, на юге Азии, в Африке.



# Отряд Гусеобразные Anseriformes

Водоплавающие птицы, по величине от очень крупных до небольших. Клюв плоский. Края челюстей усажены поперечными роговыми пластинками или зубцами. Оперение короткое, плотное, с густым пухом. Хорошо плавают. Обитатели различных водоемов. Полигамы или моногамы. В фауне Беларуси около 30 видов. Из них 17 видов гнездятся в пределах нашей страны. Остальные 13 видов встречаются на пролетах или как случайно залетные. В Красную книгу Республики Беларусь занесено 10 видов.

# Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Род Гоголь — Bucephala

Вид **ГОГОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ** — BUCEPHALA CLANGULA

1 зал, витрина 37

3 зал, витрина 22

Внешний вид. Немного меньше домашней утки. Самец белый с черной спиной и черной с зеленым отливом головой, на крыле большое белое «зеркальце», около клюва округлое белое пятно. Глаза желтые, клюв серый, лапы желтые. Самка мельче, серая с коричневой головой.

Образ жизни. Обитает на лесных водоемах. Гнездо устраивает в дуплах деревьев, часто высоко над землей. Охотно занимает искусственные гнездовья. В кладке 5-12 яиц. Питается личинками насекомых, раками, рыбой. Перелетный, транзитно мигрирующий и немногочисленный (зимующий) вид.

Зимует на Атлантическом побережье и на внутренних водоемах Центральной Европы.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.



## Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Род Гусь — Anser

Вид **ГУСЬ БЕЛОЛОБЫЙ** — ANSER ALBIFRONS

1 зал, витрина 28

3 зал, витрина 21

Внешний вид. Заметно мельче домашнего гуся. Окраска буровато-серая, на брюхе черные поперечные пятна, подхвостье белое. На лбу вокруг клюва белое пятно, не заходящее на темя. Клюв и лапы красно-желтые. Молодые птицы без пятен на брюхе и белого на лбу.

Образ жизни. В Беларуси гусь немногочислен, встречается во время весенних и осенних перелетов. Караван птиц имеет форму угла. Гусь хорошо ходит, быстро бежит, плавает, при необходимости ныряет. Кормится на лугах и полях травами, клубнями, ягодами. Населяет кустарниковые участки тундры и лесотундры Евразии, всегда вблизи глухих озер, в поймах рек и больших болот.

Зимует на южном побережье Европы.



# Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Род Гусь – Anser

Вид **ГУСЬ-ГУМЕННИК** – ANSER FABALIS

1 зал, витрина 28

3 зал, витрина 21

Внешний вид. Крупный гусь. Оперение буровато-серое, более светлые каемки перьев на спине образуют чешуйчатый рисунок. Клюв довольно длинный, черный с оранжевой перевязью, лапы оранжево-розовые.

Образ жизни. В Беларуси самый многочисленный из пролетных гусей. Часто отдыхает на речных косах, плёсах, кормится на посевах озимых. Населяет кустарниковые участки тундры и лесотундры Евразии.

Зимует на южном побережье Европы.



## Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Род Казарка — Branta

Вид **КАЗАРКА БЕЛОЩЕКАЯ** — BRANTA LEUCOPSIS

3 зал, витрина 29

Внешний вид. Немного мельче домашнего гуся. Спинная сторона, шея и зоб черные, лоб, щеки, грудь и брюшко белые, бока с буроватыми полосами.

Образ жизни. Встречается редко во время весенних и осенних перелетов. Полет напоминает полет белолобого гуся. Очень криклива, голос громкий и далеко слышный, напоминает хриплое взлаивание собаки.

Зимует на атлантическом побережье Европы.





# Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Род Речная утка — Anas

Вид **КРЯКВА ОБЫКНОВЕННАЯ** — ANAS PLATYRHYNCHOS

1 зал, витрина 28, 34, 37

3 зал, витрина 25

Внешний вид. Самая крупная из речных уток. Брачное оперение самца яркое, разноцветное, голова и шея черно-зеленые, зоб и грудь каштановые, спина и брюшная сторона тела серые с тонкими поперечными пестринами. Клюв желтый. Самка сверху бурая с ржавыми пестринами. Клюв розоватый. На крыле у самца и самки сине-фиолетовое зеркальце. Летом самец похож на самку.

Образ жизни. Населяет разнообразные пресные водоемы. Гнездо строит на земле, изредка занимает старые гнезда сорок, ворон. Кладка состоит из 7-12 яиц. Питается мелкими беспозвоночными и водными растениями. Перелетная птица, частично зимует на незамерзающих водоемах. Обычный, широко распространенный вид.

Зимует в странах Западной Европы.



самка



самец



## Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Род Лебедь — Cygnus

Вид **ЛЕБЕДЬ-ШИПУН** — CYGNUS OLOR

1 зал, витрина 8

Внешний вид. Значительно больше домашнего гуся. Оперение белое. Клюв красный, у основания высокий черный нарост. Изогнутую шею и приподнятые крылья принимает на воде. Молодые птицы буро-серые, нароста на клюве нет.

Образ жизни. Поселяется главным образом на озерах; предпочитает участки с хорошо развитой надводной растительностью. Гнездится отдельными парами. Гнездо строит на зарослях камыша, сплавах. Кладка состоит из 6-8 больших яиц. Питается подводными частями растений, водными беспозвоночными. Перелетный вид, при благоприятных условиях зимует. В настоящее время численность восстановлена на всех подходящих для него водоемах.

Зимует на Черном и Каспийском морях.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.



# Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Род Речная утка — Anas

Вид **СВЯЗЬ** — ANAS PENELOPE

1 зал, витрина 37, 41

Внешний вид. Немного мельче кряквы. Голова коричневая с золотисто-желтым лбом, зоб розовато-коричневый, спина и бока серые с тонким поперечным рисунком, брюшко белое, «зеркальце» зеленое. Самка коричнево-бурая, с темными мелкими пестринами на голове и белым брюшком, «зеркальце» зеленое. Клюв и лапы свинцово-серые.

Образ жизни. Держится на разливах рек, больших озерах, речных плесах. Гнездо строит на сухом месте. Кладка из 7-11 яиц. Пища растительная, реже водные беспозвоночные. Пролетный и изредка гнездящийся вид. Во время весенних разливов на севере Беларуси (в пойме Березины) связь многочисленна. Сотенные стаи птиц кормятся и отдыхают на водоемах заповедника.

Зимует в Южной Европе и Африке.



## Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Род Речная утка — Anas

Вид **ЧИРОК-СВИСТУНОК** — ANAS CRECCA

1 зал, витрина 31, 37

Внешний вид. Самая мелкая из речных уток, величиной с ворону. У самца в брачном наряде голова и шея коричневая с зеленой полосой по бокам, зоб охристый с черными пятнышками, бока серые с темным струйчатым рисунком, «зеркальце» зеленое с черным. Самка темно-бурая с рыжеватыми пестринками, низ беловатый, «зеркальце» зеленое. Клюв черный, лапы серые.

Образ жизни. Населяет небольшие, очень заросшие внутренние водоемы. Гнездо на земле. Кладка состоит из 8-12 яиц. Питается водными беспозвоночными. Перелетный вид. Одна из самых обычных, широко распространенных уток.

Зимует на атлантическом побережье и внутренних водоемах Западной Европы.



## Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Род Речная утка — Anas

Вид **ЧИРОК-ТРЕСКУНОК** — ANAS QUERQUEDULA

3 зал, витрина 22

Внешний вид. Немного крупнее свистунка. Голова коричневая с белой полосой от глаза к затылку, спина, грудь буроватые с темным рисунком, брюшко белое, бока и крылья серые, «зеркальце» зеленое. Утка светло-бурая с пестринами, крыло серое, «зеркальце» зеленовато-серое, без блеска.

Образ жизни. Населяет небольшие, очень заросшие внутренние водоемы. Гнездо на земле. Кладка состоит из 7-12 яиц. Питается водными беспозвоночными. Перелетный, транзитно мигрирующий и немногочисленный вид. Зимует на атлантическом побережье и внутренних водоемах Западной Европы.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.



# Отряд Гусеобразные Anseriformes


Семейство Утиные — Anatidae

Род Речная утка — Anas

Вид **ШИЛОХВОСТЬ** — ANAS ACUTA

3 зал, витрина 21

- Места обнаружения
- Места обнаружения до 1970 г.
- Область распространения



Внешний вид. Немного меньше домашней утки. Шея длинная и тонкая, хвост острый, шилоподобный. Голова темно-коричневая, шея, грудь и брюшко белые, спина и бока серые с тонким поперечным рисунком, «зеркальце» фиолетово-зеленое, подхвостье черное. Самка буровато-серая с пестринами, «зеркальце» рыжеватое, без блеска. Клюв и лапы темно-серые.

Образ жизни. Держится на заросших мелководных озерах и заболоченных поймах рек. Гнездо строит на открытых местах. Кладка из 7-11 яиц. Питается растительными и животными кормами, насекомыми и их личинками, рачками, моллюсками. Редкий, перелетный, транзитно мигрирующий вид.

Зимует в Средиземноморье, Западной Европе.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.



# Отряд Соколообразные Falconiformes

Хищные птицы крупной и средней величины. Клюв крепкий, крючковатый, когти острые и кривые. Летают парящим или активным полетом. Питаются животной пищей. Образуют постоянные пары. Обитатели различных ландшафтов.

Фауна хищных птиц Беларуси включает 27 видов. Из них 20 видов гнездятся в пределах нашей страны. Еще 2 вида — сапсан и степной лунь, ранее были известны как гнездящиеся, но в настоящее время отмечаются только как залетные или пролетные. Один вид — зимняк, встречается только на зимовке и пролетах, а 4 вида — белоголовый сип, черный гриф, могильник и курганник известны как случайно залетные.

Из всех гнездящихся у нас пернатых хищников 13 видов занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

## Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Канюк – Buteo

Вид **КАНЮК** (САРЫЧ) – BUTEO BUTEO

1 зал, витрина 6

3 зал, витрина 30, 32

Внешний вид. По величине с домашнюю утку. Окраска сильно варьирует, спина обычно темно-бурая, брюшко более светлое с продольными пестринами. Хвост полосатый, короткий, по краю широкая темная полоса. Довольно длинные крылья. Лапы желтые.

Образ жизни. Населяет старые высокоствольные леса всех типов, где древесная растительность чередуется с открытыми пространствами (лугами, болотами, вырубками, полянами). Гнезда строит на деревьях, расположение их может быть самым разнообразным. Кладка из 2-4 яиц. Питается преимущественно мышевидными грызунами. Перелетный вид, обычен на всей территории. Один из самых многочисленных из дневных хищных птиц.

Зимует в Африке и южной Азии.





# Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Соколиные – Falconidae

Род Сокол – Falco

Вид **КОБЧИК** – FALCO VESPERTINUS


3 зал, витрина 9

Внешний вид. Заметно меньше голубя. Самец аспидно-черный с рыжими «штанами» и подхвостьем, лапы красные. У самки верх серый с поперечной рябью, низ охристый, голова рыжая, хорошо заметны небольшие «усы». Молодые птицы сверху темнее, снизу светло-охристые с размытыми продольными пестринами, голова тускло-рыжая.

Образ жизни. Поселяется в агроландшафте. Гнездится на деревьях, занимая старые гнезда врановых птиц. Кладка из 3-5 яиц. Основу питания составляют крупные летающие насекомые. Перелетный вид. Очень редкий вид соколов, встречающийся преимущественно в юго-восточной части страны.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

- Места обнаружения
- Места обнаружения до 1970 г.
- Места обнаружения, требующие подтверждения





# Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Коршун – *Milvus*

Вид **КОРШУН ЧЕРНЫЙ** – *MILVUS MIGRANS*

3 зал, витрина 32

Внешний вид. По величине с домашнюю утку. Окраска темная коричнево-бурая, низ – светлее с рыжими тонами и продольными темно-коричневыми пестринами. Верх головы светлый. Вырезка на хвосте небольшая. Молодые птицы в крупных охристых пятнах.

Образ жизни. Населяет старые лиственные и смешанные леса вблизи водоемов и болот, часто встречается вблизи поселков и городов. Гнездо строит на дереве, изредка занимает старые гнезда других хищных птиц. Нередко образует гнездовые колонии. В северной части ареала – гнезда одиночные, вблизи или в колонии цапель. Кладка из 2-3 яиц. Питается падалью, снулой рыбой, различными отбросами на свалках и бойнях, реже ловит мелких птиц и грызунов. Перелетный, но немногочисленный вид распространен по всей территории.

Зимует в Африке, а также в Аравии.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

● Места обнаружения



## Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Лунь – Circus

Вид **ЛУНЬ БОЛОТНЫЙ** – CIRCUS AERUGINOSUS

1 зал, витрина 3

3 зал, витрина 34

Внешний вид. Самый крупный и темный из луней. Самец сверху каштаново бурый с серыми хвостом и крыльями, концы крыльев темные. Низ тела рыжий с пестринами, голова светлая, охристая, надхвостье беловатое. Самка темно бурая с охристой «шапочкой», белым горлом и охристыми пестринами на плечах, на надхвостье белого нет. Молодые похожи на самку.

Образ жизни. Поселяется на зарастающих водоемах и заболоченных территориях. Гнездо располагает на кочке или заломе среди зарослей тростника, других высокостебельных растений. Кладка из 4-6 яиц. Питается различными мелкими животными, особенно молодняком птиц. Вид перелетный, широко распространенный, на большей части территории.

Зимует в Африке и в Средиземноморье.



## Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Лунь – Circus

Вид **ЛУНЬ ЛУГОВОЙ** – CIRCUS PYGARGUS

1 зал, витрина 6

Внешний вид. Величиной с ворону. Спина темно-бурая, на брюшке рыжие продольные пестрины, надхвостье белое, узкое, на крыле черная полоса.

Образ жизни. Населяет агроландшафт, а также поросшие кустарником низинные переходные болота. Гнездо на земле. Кладка из 3-6 яиц. Питается мелкими животными, которых вылавливает среди травы, низко летая над полями и лугами. Перелетный вид. Немногочисленный, широко распространенный на всей территории республики; в отдельных местах довольно обычен.

Зимует в Африке и в Средиземноморье.



# Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Лунь – Circus

Вид **ЛУНЬ ПОЛЕВОЙ** – CIRCUS CYANEUS

3 зал, витрина 26, 28

Внешний вид. Величиной с ворону. Спина темно-бурая, брюшко светло-охристое с темными продольными пестринами, надхвостье белое, хвост в поперечных полосах.

Образ жизни. Обитатель обширных открытых территорий, из которых наиболее приемлемыми оказываются зарастающие лесные вырубki, закустаренные луга. Гнездо строит на земле. Кладка из 4-5 яиц. Питается мелкими животными и, в том числе мышевидными грызунами. Гнездящийся перелетный и транзитно мигрирующий вид. Довольно малочисленный, более регулярно встречается в Полесье и в Поозерье.

Зимует в Западной Европе.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

● Места обнаружения



## Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Осоед – Pernis

Вид **ОСОЕД ОБЫКНОВЕННЫЙ** – PERNIS APIVORUS

3 зал, витрина 34

Внешний вид. Заметно крупнее вороны. Спинная сторона темно-бурая, брюшная – изменчивая: от однотонно-бурой до светлой. Испод крыла полосатый, на хвосте – три широких, далеко отстоящих друг от друга полосы.

Образ жизни. Обитает в лиственных и смешанных лесах, вблизи полян. Гнездо строит на деревьях, может занимать старые гнезда других крупных птиц. Кладка из 2 (1-3) яиц. Питается личинками ос и шмелей, а также самими насекомыми, реже лягушками, грызунами. Широко распространенный и относительно обычный из хищных птиц перелетный вид. Транзитный мигрант.

Зимует в Африке.



## Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Ястреб – Accipiter

Вид **ПЕРЕПЕЛЯТНИК** (МАЛЫЙ ЯСТРЕБ) – ACCIPITER NISUS

3 зал, витрина 9

Внешний вид. По величине меньше голубя. Спина сизая, на затылке белые пятна. У самца поперечный рисунок на груди рыжий, а у самки – темно-коричневый. Продольной полосы на горле обычно нет. Глаза желтые и хорошо выраженные валики над ними (защита от сучьев в полете). Широкие, относительно короткие крылья, длинный хвост. В полете напоминает кукушку. Молодые птицы похожи на самку.

Образ жизни. Предпочитает опушки и мелколесье. Гнездо из тонких сухих веточек, чаще в средней или нижней части кроны на боковой ветви у ствола. Кладка из 3-5 яиц. В питании преобладают мелкие воробьиные птицы. Один из наиболее распространенных и обычных видов хищных птиц, живет оседло или кочует зимой.




# Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Орел – Aquila

Вид **ПОДОРЛИК МАЛЫЙ** – AQUILA POMARINA

3 зал, витрина 29

 Область распространения



Внешний вид. Величиной чуть меньше гуся. Окраска оперения однотонная бледно-бурая, на верхней стороне тела охристые пятна, образующие полосы на крыльях. Глаза янтарно-желтые.

Образ жизни. Излюбленные местообитания смешанные и лиственные, особенно черноольховые леса на заболоченных территориях или по краю болотных массивов. Гнезда высоко на деревьях. Кладка из 2 яиц. Питается мелкими животными, из которых чаще всего преобладают лягушки. Перелетный, транзитно мигрирующий вид. Распространен по всей территории. В большинстве районов встречается редко, хотя и является наиболее обычным представителем рода.

Зимует в южной Африке.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.




# Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Соколиные – Falconidae

Род Сокол – Falco

Вид **ПУСТЕЛЬГА ОБЫКНОВЕННАЯ – FALCO TINNUNCULUS**

3 зал, витрина 31

 Область распространения



Внешний вид. Мелкий (мельче голубя) сокол с относительно широкими крыльями и длинным хвостом. У самца верх красновато-коричневый с круглыми пестринами, низ охристый с продольными пестринами, голова серая или сизая, по концу хвоста темная полоса. Когти черные. У самки верх ржаво-рыжий с поперечными полосами, голова почти одноцветна со спиной. Молодые птицы бледнее, пестрины размытые.

Образ жизни. Типичный обитатель открытых территорий, в том числе агроландшафта. Во время охоты часто зависает в воздухе, быстро трясая крыльями. Для вывода потомства занимает старые гнезда серых ворон. Кладка из 4-6 яиц. Питается мышевидными грызунами. Вид перелетный, немногочисленный.

Зимует в западных и южных частях Европы, в северной Африке.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.





# Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Скопиные – Pandionidae

Род Скопа – Pandion

Вид **СКОПА** – PANDION HALIAETUS

3 зал, витрина 33

- Места обнаружения
- Места обнаружения до 1970 г.
- Места обнаружения, требующие подтверждения
- ▨ Область распространения



Внешний вид. Величиной с утку. Верх тела темно-коричнево-бурый, низ белый с темными пестринами. Хвост короткий. Цевка не оперена. Самка немного крупнее самца. Издалека слегка напоминает в полете чайку.

Образ жизни. Охотится на богатых рыбой водоемах, а для гнездования нуждается в древесной растительности. При этом выбирает глухие участки леса или болота, значительно удаленные от кормовых водоемов. Гнездо большое из толстых сучьев на деревьях. Кладка из 3 яиц. Питается рыбой разных видов (до 2-3 кг весом), которую высматривает на парящем полете и хватает лапами. Редкий перелетный вид. В Поозерье встречается чаще, чем на остальной территории.

Зимует в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Индии.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.



## Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род Ястреб – Accipiter

Вид **ТЕТЕРЕВЯТНИК** (БОЛЬШОЙ ЯСТРЕБ) – ACCIPITER GENTILIS

1зал, витрина 3

Внешний вид. Заметно крупнее вороны. Молодая птица буровато-охристая с продольными пестринами на груди и брюхе. Голова небольшая, плоская, несколько темнее с белой бровью. Подхвостье белое. Хвост узкий, длинный с 4 продольными полосами. Глаза и лапы желтые.

Самки крупнее самцов.

Образ жизни. Населяет преимущественно старые хвойные, смешанные леса (часто заболоченные), перемежающиеся полями и лугами. Гнездо строит на деревьях (сосна, ель, береза, дуб, липа), часто использует гнезда других птиц. Кладка из 3-4 яиц. Питается различными птицами (голубями, дятлами, рябчиками, тетеревами и др.), из млекопитающих нападает на зайцев, белок. Обычный, широко распространенный оседлый вид, зимой кочует.



# Отряд Соколообразные Falconiformes

Семейство Соколиные – Falconidae

Род Сокол – Falco

Вид **ЧЕГЛОК** – FALCO SUBBUTEO

1 зал, витрина 10

Внешний вид. Немного меньше голубя. Спинная сторона темно-серая, грудь и брюшко беловатые, в крупных темных продольных пестринах, «штаны» рыжие. «Усы» широкие и хорошо заметные. Окраска молодых птиц менее яркая, с охристым налетом.

Образ жизни. Предпочитает селиться по опушкам лесов, особенно сосняков, вблизи обширных речных долин или суходольных лугов. Занимает старые гнезда воронов и серых ворон. Кладка из 3, реже 4-5 яиц. Питается мелкими птицами и стрекозами, которых ловит на лету. Перелетный вид. Немногочисленный вид, но распространен широко.

Зимует в южной Африке.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

Область распространения



# Отряд Курообразные Galliformes

Птицы различны по величине: от очень крупных до мелких. Телосложение плотное, шея короткая, ноги сильные, приспособленные для ходьбы и разгребания земли. Птицы летают активным и быстрым полетом только на небольшие расстояния. Гнездятся на земле. Пища преимущественно растительная. В фауне Беларуси представлено 7 видов.

# Отряд курообразные Galliformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Род Глухарь – Tetrao

Вид **ГЛУХАРЬ** – TETRAO UROGALLUS

1 зал, витрина 28

3 зал, витрина 7

Внешний вид. Немного крупнее домашнего гуся. Самец серовато-черный с коричнево-бурыми крыльями и белыми пятнами на брюхе. Клюв беловатый. Испод крыла белый. Самка буровато-рыжая с черным рисунком (рябью).

Образ жизни. Населяет старые хвойные и смешанные суходольные леса, верховые болота. Пар не образует (полигам). Гнездо строит на земле. Кладка из 5-9 яиц. Летом питается травянистыми растениями, ягодами, насекомыми, зимой хвоей сосны. Оседлый, немногочисленный вид. Распространен не равномерно. Более обычен в лесах Брестской, Витебской и Минской областей.



самец



самка



## Отряд курообразные Galliformes

Семейство Фазановые – Phasianidae

Род Серая куропатка – Perdix

Вид **КУРОПАТКА СЕРАЯ** – PERDIX PERDIX

1 зал, витрина 6, 9, 31, 49

Внешний вид. Величиной с голубя. Оперение серое со светлыми продольными пестринами на крыльях и поперечными буроватыми на боках. На белом брюшке у самцов подковообразное ржаво-коричневое пятно.

Образ жизни. Обитает на полях, освоенных торфяниках, на суходольных лугах, опушках, зимой на дорогах. Гнездо на земле. Держится парами (моногам), в негнездовое время стайками. Кладка из 9-26 яиц. Питается семенами и побегами различных растений, насекомыми. Оседлый, обычный, широко распространенный вид. Чаще встречается на юге Беларуси.



## Отряд Курообразные Galliformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Род Рябчик – Tetrastes

Вид **РЯБЧИК** – TETRASTES BONASIA

3 зал, витрина 5

Внешний вид. Немного крупнее голубя. Оперение буровато-серое с черными, серыми, рыжими и белыми крапинками. На голове хохолок. У самца черное горло.

Образ жизни. Встречается во всех типах леса с хорошо развитым подлеском из ели, лещины, рябины. Избегает открытых мест. Гнездо строит на земле. Моногам. Кладка из 7-10 яиц. Летом питается травянистыми растениями, ягодами, насекомыми, зимой почками и сережками ольхи, березы. Оседлый, обычный, наиболее многочисленный в северных районах вид.





## Отряд курообразные Galliformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Род Тетерев – Lyrurus

Вид **ТЕТЕРЕВ** – LYRURUS TETRIX

3 зал, витрина 8

Внешний вид. Величиной с курицу. Оперение у самца черное с синевато-фиолетовым оттенком, с белой полосой на крыле и белым подхвостьем. Брови красные. Самка буровато-рыжая с черным рисунком (рябью).

Образ жизни. Держится в смешанных и лиственных лесах с примесью березы и осины, произрастающих по краям болот. Гнездо на земле. Полигам. Кладка из 5-14 яиц. Питается травянистыми растениями, ягодами, насекомыми, зимой почками и сережками березы. Оседлый, немногочисленный, местами обычный вид. Распространен широко, но неравномерно, наиболее многочислен в Поозерье и Полесье.



# Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Разнородная группа околводных и наземных птиц. Журавлеобразные населяют открытые пространства: поля, болота; некоторые живут в зарослях околводной растительности по берегам водоемов. Образуют пары. В фауне Беларуси представлено 6 видов.

В Красную книгу занесено 3 вида.

# Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Семейство Журавлиные – Gruidae

Род Журавль – Grus

Вид **ЖУРАВЛЬ СЕРЫЙ** – GRUS GRUS


3 зал, витрина 19

Внешний вид. Крупная птица серой окраски с черными концами крыльев. Голова и шея черные, на затылке красное пятно. Ноги черные. У молодых голова оперена, красного цвета нет.

Образ жизни. Населяет большие лесные болота и озера с болотистыми поймами. Брачные игры своеобразные танцы. Моногам. Гнездо на земле, диаметром до метра. Кладка из 2 яиц. Питается преимущественно растениями, насекомыми, лягушками. Перелетный, редкий вид. Распространен на всей территории республики, но очень неравномерно.

Зимует в Африке, на юго-западе Европы, на Ближнем Востоке.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

 Область распространения



# Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Семейство Пастушковые – Rallidae

Род Камышница – Gallinula

Вид **КАМЫШНИЦА** – GALLINULA CHLOROPUS

1 зал, витрина 4

Внешний вид. Величиной с голубя. Оперение матово-черное. Ноги длинные с длинными пальцами. Небольшой клюв и «бляшка» на лбу красные, ноги зеленоватые. Молодые птицы светло-бурые, клюв серо-желтый, «бляшки» нет.

Образ жизни. Населяет берега заросших озер, стариц, прудов, канав. Хорошо плавает, характерно кивая головой. Моногам. Гнездо из сухих стеблей и листьев камыша помещается на кочке. Кладка из 6-12 яиц. Питается водными беспозвоночными. Перелетный, обычный, широко распространенный вид.

Зимует в Африке.

молодая



взрослая



# Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Семейство Пастушковые — Rallidae

Род Коростель — Crex

Вид **КОРОСТЕЛЬ** — CREX CREX

1 зал, витрина 31

3 зал, витрина 29

Внешний вид. Заметно крупнее скворца. Оперение рыжевато-бурое с пестринами на спине и поперечными неясными полосами на боках. Клюв короткий.

Образ жизни. Населяет сырые луга и поля. Бегают очень быстро, но летает плохо и неуверенно, при взлете ноги висят вниз. Гнездо строит на земле в траве, укрыто, найти его можно только случайно. Кладка из 7-12 яиц. Питается различными насекомыми, семенами растений. Перелетный, немногочисленный вид, распространен широко.

Зимует в Африке.

В Беларуси в 1996 году вид исключен из списка охотничьих.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

Область распространения



## Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Семейство Пастушковые — Rallidae

Род Лысуха — Fulica

Вид **ЛЫСУХА** (ВОДЯНАЯ КУРИЦА) — FULICA ATRA

1 зал, витрина 8

Внешний вид. Заметно крупнее вороны. Окраска матово-черная, на брюшке с сероватым оттенком, на лбу белая кожистая «бляшка». Пальцы с фестонобразными плавательными перепонками. Клюв белый. Лапы серые. У молодых горло и передняя часть шеи белые, низ серый.

Образ жизни. Населяет богатые водной растительностью водоемы. Гнездо строит у воды в зарослях растительности. Кладка из 7-10 яиц. Питается водными растениями, реже беспозвоночными, мелкой рыбой. Перелетная птица. Обычный на всей территории вид, а на отдельных водоемах даже многочисленный.



# Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Семейство Пастушковые — Rallidae

Род Пастушок — Rallus

Вид **ПАСТУШОК ВОДЯНОЙ** — RALLUS AGUATICUS

1 зал, витрина 40

3 зал, витрина 17

Внешний вид. Немного мельче голубя. Шея и грудь темно-серые, спина коричневая с пестринами, на боках черные и белые полосы. Клюв сравнительно длинный, слегка изогнут книзу. Лапы желтые. Молодые птицы бурее, на груди поперечные полосы.

Образ жизни. Населяет берега небольших зарастающих водоемов. Хорошо ныряет и плавает. Активен преимущественно ночью. Гнездо строит на кочке или заломе тростника. Кладка из 7-10 яиц. Питается водными беспозвоночными. Перелетный, широко распространенный вид. В большинстве районов немногочислен и лишь местами более или менее обычен.

Зимует в южной Европе и Африке.

В Беларуси в 1996 году вид исключен из списка охотничьих.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.





## Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Семейство Пастушковые — Rallidae

Род Погоныш — Porzana

Вид **ПОГОНЫШ** (БОЛОТНАЯ КУРОЧКА) — PORZANA PORZANA

3 зал, витрина 17

Внешний вид. Немного крупнее скворца. Окраска темная, сверху оливково-бурая со светлыми и темными пестринами, снизу голубовато-серая с белыми пятнышками, на боках поперечные полосы.

Образ жизни. Населяет травянистые болота и заросшие берега водоемов. Гнездо располагается на кочке или в заломе тростника. Кладка из 8-10 яиц. Питается водными беспозвоночными. Перелетный, обычный широко распространенный вид.

Зимует в южной Европе и Африке.



## Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Семейство Пастушковые — Rallidae

Род Султанская курица — Porphyrion

Вид **СУЛТАНКА** — PORPHYRIO POLIOCEPHALUS

3 зал, витрина 33

Внешний вид. Заметно крупнее вороны. Оперение зеленовато-голубое с металлическим отливом, надхвостье белое. Ноги, клюв и «бляшка» на лбу оранжево-красные.

Образ жизни. Вид распространен на территориях, прилегающих к Каспийскому морю, среди зарослей тростника и камыша. Гнездо размещается на кочке. Кладка из 6-9 яиц. Питается водными растениями. Содержится и успешно размножается в зоопарках Беларуси.

♦ Вид занесен в Красную книгу России.



# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Мелкие и средней величины птицы с длинными тонкими ногами. Клюв длинный. Крылья узкие. Хвост короткий. Оперение плотное, обычно неярко. За немногими исключениями, моногамы. В фауне Беларуси отряд представлен 43 видами. В Красную книгу занесено 17 видов.

## Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Род Бекас — Gallinago

Вид **БЕКАС** — GALLINAGO GALLINAGO

1 зал, витрина 39

Внешний вид. Крупнее скворца. Спина темно-бурая с охристыми пестринами, грудь буровато-охристая с продольными пестринами, брюшко белое. Темя черное с продольной охристой полосой.

Образ жизни. Населяет осоковые болота, луга в поймах рек и озер. Полет стремительный, с несколькими зигзагами после взлета. Токовый полет сопровождается дребезжащим звуком, напоминающим бление, производимым перьями хвоста. Гнездо строит на кочке. Кладка из 4 яиц. Питается червями, насекомыми и их личинками. Перелетный вид, один из самых обычных куликов. Распространен повсеместно.

Зимует в Западной Европе и Африке.



## Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Род Вальдшнеп — Scolopax

Вид **ВАЛЬДШНЕП** — SCOLOPAX RUSTICOLA

1 зал, витрина 40

3 зал, витрина 12

Внешний вид. Величиной с голубя. Кулик с очень длинным клювом и на невысоких ногах. Верх рыжевато-ржавый с темными и светлыми пестринами, низ серый с поперечным бурым рисунком. Глаза большие черные, отнесены несколько к затылку.

Образ жизни. Гнездится исключительно в лесах. Предпочитает сырые, тенистые, граничащие с болотами участки леса. Гнездо строит на земле. Кладка из 4 яиц. Питается дождевыми червями, насекомыми, которых отыскивает в лесной подстилке. Перелетный вид, обычный на всей территории. Несколько реже встречается в малолесистых районах.

Зимует на юге Евразии и в Северной Африке.



# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Род Гаршнеп — *Limnocryptes*

Вид **ГАРШНЕП** — *LYMNOCRYPTES MINIMUS*

1 зал, витрина 38


Внешний вид. Мелкий (мельче скворца) куличок с прямым средней длины клювом и на невысоких ногах. Спина черно-бурая с охристыми продольными полосками, брюшко белое. Над глазом светлая полоска, лоб и темя черные, ноги желтовато-бурые.

Образ жизни. Местами обитания в гнездовой период являются низинные болота, заросшие осокой и хвощом болотины среди лугов. Гнездо устраивает на кочке. Кладка из 4 яиц. Питается личинками насекомых, червями, моллюсками. Перелетный, транзитно мигрирующий и изредка зимующий вид. Большинство находок гнезд и других свидетельств гнездования приходится на северную часть Беларуси.

Зимует в Западной Европе, Закавказье, Южной Азии.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

- Места обнаружения
- Места обнаружения до 1970 г.
- Места обнаружения, требующие подтверждения



# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Род Бекас – Gallinago

Вид **ДУПЕЛЬ** – GALLINAGO MEDIA

1 зал, витрина 30

4 зал, окно «Болото»

Внешний вид. Значительно крупнее скворца. Очень похож на бекаса, но бока груди и брюшко покрыты поперечными пестринами. Крайние перья хвоста белые, иногда с полосками.

Образ жизни. Населяет открытые влажные пойменные луга, реже переходные болота. Гнездо обычно на кочке. Кладка из 4 яиц. Полет прямой, неторопливый, низко над землей. Взлетает молча. Весной самцы характерно токуют, при этом издают щебечущие звуки. Питается личинками насекомых, червями, моллюсками. Перелетный, транзитно мигрирующий, немногочисленный вид, но более обычен на Полесье.

Зимует в тропической Африке.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

● Места обнаружения  
□ Места обнаружения,  
требующие подтверждения





## Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Чайковые — Laridae

Род Настоящая чайка — Larus

Вид **КЛУША** — LARUS FUSCUS

1 зал, витрина 35

Внешний вид. Значительно крупнее вороны. Оперение белое, за исключением черной спины и крыльев. Клюв большой, ярко-желтый, ноги желтые. Молодые особи бурые с охристыми пестринами.

Образ жизни. Встречается на весенних и осенних пролетах на крупных озерах и реках. Летом отмечена в окрестностях Пинска, на Заславском водохранилище, на озерах около Лепеля. Питается рыбой, грызунами, мелкими птицами, и их яйцами, червями, насекомыми. Гнездится колониями на морских побережьях и больших озерах Северной Европы.



## Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Чайковые — Laridae

Род Крачка болотная — Chlidonias

Вид **КРАЧКА БЕЛОКРЫЛАЯ** — CHLIDONIAS LEUCOPTERA

3 зал, витрина 33

Внешний вид. Величиной с голубя. Оперение черное. Нижняя часть спины, надхвостья и подхвостья белые, крылья сизые с белой каймой по сгибу. Клюв и лапы красные.

Образ жизни. Населяет озера, старицы, осоковые луга с открытой водой. Гнездится колониями. Гнездо на сплаvine. Кладка из 3 яиц. Питается водными беспозвоночными и наземными насекомыми, реже поедает мальков рыб. Перелетный вид. Обычен на гнездовании в Полесье, но немногочислен на остальной территории.

Зимует в тропической Африке.



# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Чайковые – Laridae

Род Крчка настоящая – Sterna

Вид **КРАЧКА МАЛАЯ** – STERNA ALBIFRONS

1 зал, витрина 36

Внешний вид. По величине меньше голубя. Верх тела светло-серый, на голове черная «шапочка». Клюв красный с черным концом. Ноги красные.

Образ жизни. Населяет поймы крупных и средних рек, озера, водохранилища. Гнездится небольшими колониями. Гнездо ямка без всякой подстилки. Кладка из 3 яиц. Питается мелкой рыбой, беспозвоночными. Перелетный, транзитно мигрирующий, немногочисленный вид.

Зимует в Африке.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

● Места обнаружения  
▨ Область распространения



## Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Чайковые — Laridae

Род Крачка настоящая — Sterna

Вид **КРАЧКА РЕЧНАЯ** — STERNA HIRUNDO

1 зал, витрина 36

Внешний вид. Немного мельче голубя. Крылья очень длинные и узкие. Верх серый, низ белый. На голове черная «шапочка». Клюв красный с черным концом. Ноги красные.

Образ жизни. Населяет разнообразные водоемы, но, как правило, крупные и с чистой водой. Гнездится колониями. Гнездо устраивает на плоских песчаных берегах. Кладка из 2-3 яиц. Питается водными беспозвоночными, мальками рыб. Перелетный, обычный вид, распространен широко, но неравномерно.

Зимует в Африке.



# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Род Кроншнеп — Numenius

Вид **КРОНШНЕП БОЛЬШОЙ** — NUMENIUS ARQUATA

3 зал, витрина 12

Внешний вид. Крупнее вороны. Оперение буро-серое с черными пестринами, на голове и груди узкие продольные пестрины, надхвостье белое. Ноги длинные. Клюв длинный, тонкий, загнутый вниз.

Образ жизни. Обитает на крупных верховых и низинных болотах, влажных лугах и поймах. Гнездо неглубокая ямка в земле, в травяной кочке. Кладка из 4 яиц. Питается насекомыми и их личинками, мелкими моллюсками, растительной пищей (ягодами, семенами). Перелетный, транзитно мигрирующий, редкий вид. Несколько чаще встречается в Поозерье.

Зимует в Англии, Восточной Африке и Южной Азии.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

● Места обнаружения



# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Ржанковые — Charadriidae

Род Ржанка — Pluvialis

Вид **РЖАНКА ЗОЛОТИСТАЯ — PLUVIALIS APRICARIA**

1 зал, витрина 39

3 зал, витрина 12

Внешний вид. Немного мельче голубя. Спинная сторона темная с золотисто-желтыми пятнышками. Бока белые, брюшная сторона черная. Подмышечные перья белые. Заднего пальца нет. У самки окраска тусклее, с белыми пестринами на брюшке.

Образ жизни. Обитает на обширных верховых болотах, поросших низкорослой сосной и березой. Гнездо — не глубокая ямка, выстланная стеблями и мхом. Располагается на сухих местах или моховых кочках. Кладка из 4 яиц. Питается различными беспозвоночными. Очень редкий, перелетный и транзитно мигрирующий вид. Встречается преимущественно на верховых болотах Витебской области.

Зимует на юге и западе Европы (Великобритания, Ирландия, где часто оседлая), на севере Африке, в Азии.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

Область распространения



## Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Род Улит — Tringa

Вид **ТРАВНИК** (КРАСНОНОЖКА) — TRINGA TOTANUS

1 зал, витрина 39

Внешний вид. Заметно меньше голубя. Верх буровато-серый с черными пестринами, низ белый с частыми пестринами. Надхвостье белое. На крыле в полете широкая белая полоса. Ноги красные.

Образ жизни. Населяет открытые травянистые болота и сырые луга. Гнездо на земле. Кладка из 4 (реже 3) яиц. Питается наземными и водными беспозвоночными. Обычный перелетный и пролетный вид, наиболее многочислен на Полесье.

Зимует в Африке, Южной Азии, Юго-Западной Европе.





# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Род Улит — Tringa

Вид **УЛИТ БОЛЬШОЙ** — TRINGA NEBULARIA

3 зал, витрина 29

Внешний вид. Немного мельче голубя. Окраска верхней части тела темно серая, снизу белая. Клюв слегка изогнут вверх. Ноги темные, длинные, в полете далеко выступают за конец хвоста.

Образ жизни. Населяет верховые и переходные болота, а также заболоченные вырубки вблизи болот. Гнездо строит на земле. Кладка из 4 яиц. Питаются насекомыми и их личинками, мелкими моллюсками, небольшими лягушками, ящерицами, мелкой рыбой. Перелетный, транзитно мигрирующий, редкий вид.

Зимует в Средиземноморье, Африке, Австралии.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

Места обнаружения  
Область распространения



## Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Род Улит — Tringa

Вид **ФИФИ** — TRINGA GLAREOLA

3 зал, витрина 12

Внешний вид. Немного крупнее скворца. Основной фон оперения буровато-серый со светлыми полосами и пестринами сверху, белый с брюшной стороны. Ноги зеленоватые.

Образ жизни. Населяет болота, заболоченные окраины леса, заливные луга. Гнездо на земле вблизи воды. Кладка из 4 яиц. Питается водными беспозвоночными. Перелетный, широко распространен на всей территории вид. В большинстве районов Беларуси сравнительно немногочислен, местами обычен.

Зимует в Африке.



# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Чайковые — Laridae

Род Настоящая чайка — Larus

Вид **ЧАЙКА ОЗЕРНАЯ** — LARUS RIDIBUNDUS

2 зал, витрина 36

3 зал, витрина 32

Внешний вид. Среднего размера (с ворону) чайка. Голова коричневая, крылья серые с черными концами, остальное оперение белое. Клюв и лапы красные. Молодые бурые сверху и белые снизу, концы крыльев черные, по концу хвоста узкая темная полоса.

Образ жизни. Обитает на заросших озерах, прудах, реже реках. Гнездится колониями. Гнездо строит на земле. Кладка из 3 (реже 4) яиц. Питается водными и наземными насекомыми, дождевыми червями, рыбой, лягушками, мелкими грызунами. Перелетный, широко распространенный вид. Наиболее многочислен из всех чайковых.

Зимует в Средиземноморье.



## Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Чайковые — Laridae

Род Настоящая чайка — Larus

Вид **ЧАЙКА СЕРЕБРИСТАЯ (ХОХОТУНЯ)** — LARUS ARGENTATUS

3 зал, витрина 33

Внешний вид. Крупная (значительно больше вороны) чайка. Крылья серые различных оттенков с черными концами, все остальное тело белое. Клюв желтый с красным пятном на выступе подклювья. Лапы розовые или желтые. Молодые птицы буровато-серые.

Образ жизни. Селится птица на обширных верховых болотах с обилием больших и малых озер, на крупных озерах. Гнездится колониями, строя гнезда на земле. Кладка из 2-3 яиц. Питается рыбой, водными беспозвоночными, мелкими грызунами, ягодами, падалью. Перелетный, транзитно мигрирующий, немногочисленный вид. В настоящее время продолжается рост численности и расширение ареала вида в Беларуси.

Зимует на побережье Средиземноморья, Черном и Каспийском морях.



# Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Чайковые – Laridae

Род Настоящая чайка – Larus

Вид **ЧАЙКА СИЗАЯ** – LARUS CANUS

1 зал, витрина 36

3 зал, витрина 12

Внешний вид. Величиной с ворону. Оперение белое, крылья серые, концы черные. Клюв и ноги желтые. Молодые птицы буровато-серые.

Образ жизни. Гнездится небольшими колониями или отдельными парами на разных типах водоемов и в урбанизированном ландшафте. Гнездо строит на земле. Кладка из 2-3 яиц. Питается рыбой, водными беспозвоночными, пищевыми отходами на свалках. Перелетный, немногочисленный вид. В настоящее время гнездование известно во всех областях республики.

Зимует на побережье Средиземноморья, Черном и Каспийском морях.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

■ Область распространения



# Отряд Голубеобразные Columbiformes

Птицы средней величины, с плотным массивным телом. Крылья длинные и острые, ноги и шея короткие. У основания клюва хорошо развита восковица. Питаются исключительно растительной пищей (семенами). В фауне Беларуси представлено 5 видов.

## Отряд Голубеобразные Columbiformes

Семейство Голубиные – Columbidae

Род Голубь – Columba

Вид **ГОЛУБЬ СИЗЫЙ** – COLUMBA LIVIA

2 зал, витрина 36, 37

Внешний вид. Величина общеизвестна . Оперение сизое, на шее с металлическим отливом, на пояснице белое. На крыльях 2 поперечные темные полосы, на конце хвоста одна широкая.

Образ жизни. Обитает исключительно в населенных пунктах (городах), в меньшем количестве встречается в небольших поселках и деревнях. Гнезда на чердаках, в нишах, на карнизах. Кладка 3-4 раза в год (первая с февраля-марта) состоит из 2 белых яиц. Питается семенами самых различных растений. Оседлый, многочисленный, широко распространенный вид.





# Отряд СOVOOбразные Strigiformes

Хищные птицы, ведущие в основном ночной образ жизни. Глаза направлены вперед. Крылья широкие, закругленные. Оперение рыхлое, мягкое. Когти сильно загнутые, острые. Ноги часто оперены до самых когтей. Полет очень маневренный и бесшумный. Пища в основном грызуны и птицы, у мелких сов насекомые. Образуют постоянные пары. В Беларуси обитает 13 видов сов. В Красную книгу занесено 8 видов.

# Отряд Совообразные Strigiformes

Семейство Совиные — Strigidae

Род Неясыть — Strix

Вид **НЕЯСЫТЬ ДЛИННОХВОСТАЯ — STRIX URALENSIS**

3 зал, витрина 27

Внешний вид. Заметно крупнее вороны, с длинным полосатым хвостом. Окраска светлая, охристая, с густыми продольными темными пестринами. Глаза черные на одноцветном лицевом диске.

Образ жизни. Предпочитает переувлажненные участки хвойных и лиственных лесов. Гнездо строит на дереве, иногда в дупле, на земле. Кладка из 2-4 яиц. Питается мышевидными грызунами, но нападает и на птиц. Оседлый, очень редкий вид. В лесах северной Беларуси является довольно обычным видом.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

Область распространения



## Отряд Совообразные Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

Род Неясыть – Strix

Вид **НЕЯСЫТЬ ОБЫКНОВЕННАЯ** (СЕРАЯ) – STRIX ALUCO

1 зал, витрина 44

3 зал, витрина 3

Внешний вид. Величиной с ворону, с коротким хвостом. Окраска серая либо рыжая. На спине светлые и темные пятна. На груди и брюшке широкие продольные темные пестрины. Глаза черные с красноватыми веками.

Образ жизни. Населяет лиственные, смешанные и хвойные леса, старые рощи и парки. Гнездо строит в дупле, реже занимает старые гнезда сорок и ворон или поселяется на чердаках заброшенных зданий. Кладка из 2-6 яиц. Питается мышевидными грызунами, мелкими млекопитающими, реже насекомыми и лягушками. Оседлый, обычный вид, широко распространен на всей территории.



# Отряд Совообразные Strigiformes

Семейство Совиные — Strigidae

Род Ушастая сова — Asio

Вид **СОВА БОЛОТНАЯ** — ASIO FLAMMEUS


3 зал, витрина 27

Внешний вид. Немного мельче вороны. Спина желтовато-бурая, низ светлее, поперечной штриховки на перьях боков нет. «Уши» едва заметны (до 18-20 мм). Глаза желтые.

Образ жизни. Обитает на открытых территориях низинных и переходных болотах, пойменных и суходольных лугах. Гнездится исключительно на земле, в отличие от других сов самостоятельно строит гнездо. В кладке от 5 до 10 яиц. Питается мышевидными грызунами. Перелетный, в отдельные годы в незначительном количестве зимующий вид. Немногочисленный вид, но распространен широко.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

- Места обнаружения
- Места обнаружения до 1970 г.
- Места обнаружения, требующие подтверждения



## Отряд Совообразные Strigiformes

Семейство Совиные — Strigidae

Род Ушастая сова — Asio

Вид **СОВА УШАСТАЯ** — ASIO OTUS

1 зал, витрина 48

Внешний вид. Немного мельче вороны. Оперение охристо-рыжеватое, с продольными темными пестринами. На голове хорошо заметны длинные «уши» (до 55 мм). Глаза оранжево-красные.

Образ жизни. Населяет леса различного типа, предпочитает хвойные породы, не избегает культурного ландшафта (сады, парки). Гнездится в старых гнездах других птиц (ворона, канюк и др.), реже в дуплах деревьев. Кладка из 4-5 яиц. Питается мышевидными грызунами, реже птицами. Кочующий, широко распространенный вид, пожалуй, самый многочисленный из всех сов.



# Отряд Совообразные Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

Род Домовый сыч – Athene

Вид **СЫЧ ДОМОВЫЙ** – *ATHENE NOCTUA*


3 зал, витрина 3

Внешний вид. Похож на мохноногого сыча, но лицевой диск неполный (нижняя часть сливается с оперением шеи). Оперение спинной стороны тела бурое со светлыми пятнами. На голове светлые продольные пестрины.

Образ жизни. Обитает преимущественно на освоенных человеком территориях, в том числе и в населенных пунктах. Гнездится в разнообразных убежищах: на чердаках, в кучах камней, а также в дуплах деревьев. Кладка из 3-7 яиц. Питается мышевидными грызунами, насекомыми, изредка – мелкими птицами. Оседлый вид. Редкий, лишь местами многочисленный вид.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

- Места обнаружения
- Места обнаружения до 1970 г.
- Места обнаружения, требующие подтверждения



## Отряд Совообразные Strigiformes

Семейство Совиные — Strigidae

Род Мохноногий сыч — Aegolius

Вид **СЫЧ МОХНОНОГИЙ** — AEGOLIUS FUNEREUS

3 зал, витрина 3

Внешний вид. Немного крупнее скворца. Пальцы густо оперены до когтей, «уши» отсутствуют. Спинная сторона бурая в белых пятнах, на голове белые пятна округлые. Брюшная сторона светлая с нерезкими буроватыми пестринами. Лицевой диск полный, круглый. Глаза и клюв желтые.

Образ жизни. Обитает в хвойных и смешанных лесах. Гнездо строит в дупле. Охотно занимает старые дупла желны. Кладка из 4-6 яиц. Питается мышевидными грызунами, землеройками и мелкими птицами, зимой устраивает в дуплах запасы. Оседлый вид, широко распространен на всей территории, но неравномерно.





# Отряд Совообразные Strigiformes

Семейство Совиные — Strigidae

Род Филин — Bubo

Вид **ФИЛИН** — BUBO BUBO


1 зал, витрина 45

Внешний вид. Величиной с домашнего гуся. Верх тела темно рыжий с черными пестринами, грудь рыжая с продольными пестринами, на боках и брюхе тонкий темный поперечный рисунок. Лапы оперены до когтей. Глаза красновато оранжевые.

Образ жизни. Населяет обширные массивы старых смешанных и лиственных лесов. Гнездо обычно располагает на земле, нередко использует старые гнезда крупных хищных птиц. В кладке 2-4 яйца. Питается всевозможными животными от зайцев, тетеревов и уток до мышевидных грызунов и мелких воробьиных птиц. Оседлый, очень редкий вид. Вся территория республики входит в пределы его ареала. Находится под угрозой исчезновения.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

- Места обнаружения
- Места обнаружения до 1970 г.
- Места обнаружения, требующие подтверждения



# Отряд Ракшеобразные Coraciiformes

Птицы средние и мелкие по величине, очень разнородные по внешнему виду. Окраска большинства видов яркая, пестрая. Гнездятся в дуплах, щелях, норах. Пища животная. Моногамы. В фауне Беларуси представлено 4 вида. В Красную книгу занесено 3 вида.

## Отряд Ракшеобразные Coraciiformes

Семейство Удодовые – Upipidae

Род Удод – Урира

Вид **УДОД** – URUPA EPOPS

3 зал, витрина 3

Внешний вид. Немного мельче голубя. Оперение пестрое: охристо-рыжее с черным и белым. На голове веерообразный хохол. Клюв длинный, загнут вниз.

Образ жизни. Населяет открытые места с редколесьем, рощами, встречается в старых парках, садах, вблизи населенных пунктов. Гнездо устраивает в дупле, груде камней, норе. Кладка из 3-9 яиц. Питается беспозвоночными. Широко распространенный перелетный и пролетный вид. В южных районах республики обычен, в северных немногочислен.

Зимует в Африке, Южной Азии.





# Отряд Дятлообразные Piciformes

Птицы мелкие и средние по величине, ведущие древесный образ жизни. Оперение короткое, жесткое, у некоторых видов яркое. Клюв массивный, приспособленный для долбления древесины. Язык длинный, липкий. Ноги хорошо приспособлены для лазанья по деревьям. Полет быстрый, прямой, маломаневренный. Моногамы. В фауне Беларуси представлено 10 видов. В Красную книгу занесено 4 вида.

## Отряд Дятлообразные Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

Род Черный дятел – Dryocopus

Вид **ЖЕЛНА** (ДЯТЕЛ ЧЕРНЫЙ) – DRYOCOPUS MARTIUS

3 зал, витрина 26

Внешний вид. Величиной с ворону. Оперение черное. У самца темя, а у самки затылок красные.

Образ жизни. Населяет высокоствольные еловые, сосновые, елово-дубовые леса. Гнездо помещается в дупле с прямоугольным или овальным летком. Кладка из 3-5 яиц. Дупла желны охотно заселяют совы, клинтух, летучие мухи. Питается разнообразными жуками и их личинками. Обычный оседлый вид, встречается повсеместно.



## Отряд Дятлообразные Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

Род Пестрый дятел – Dendrocopos

Вид **ДЯТЕЛ БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ** – DENDROCOPOS MAJOR

1 зал, витрина 15, 46

3 зал, витрина 6

Внешний вид. Немного крупнее скворца. Верх головы, спина и надхвостье черные. У самца затылок красный, у самки черный. Лоб, щеки, горло, грудь, брюшко, полосы на крыльях, хвосте белые. Подхвостье красное.

Образ жизни. Населяет практически все типы крупноствольных спелых лесов. Гнездо устраивает в дупле. Кладка из 5-7 яиц. Питается разнообразными насекомыми, которых достает из-под коры. Обычный оседлый вид, самый многочисленный из дятлов. Распространен на всей территории Беларуси.



## Отряд Дятлообразные Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

Род Пестрый дятел – Dendrocopos

Вид **ДЯТЕЛ МАЛЫЙ ПЕСТРЫЙ** – DENDROCOPOS MINOR

3 зал, витрина 6

Внешний вид. Немного крупнее воробья. Верх, крылья и хвост черные. Голова, поперечные полосы на крыльях белые. У самца на голове красная «шапочка».

Образ жизни. Предпочитает лиственные и смешанные леса в поймах рек. Гнездо помещается в дупле, которое выдалбливает в гнилых деревьях невысоко. Кладка из 5-8 яиц. Питается различными насекомыми и их личинками. Немногочисленный оседлый вид. Встречается на всей территории, но чаще в районах Полесья.





# Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Обширный отряд преимущественно мелких и средних по величине птиц, различных по облику, образу жизни, местам обитания и способам добывания пищи. Большинство видов певчие птицы. Моногамы. В фауне Беларуси представлено около 95 видов. В Красную книгу занесено 8 видов.

## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Ткачиковые – Ploceidae

Род Воробей – Passer

Вид **ВОРОБЕЙ ПОЛЕВОЙ** – PASSER MONTANUS

1 зал, витрина 7, 24

2 зал, витрина 16, 36

Внешний вид. Птица массой 20-25 г. Верх буровато-коричневый, низ беловатый. На спине и крыльях темные пятна. На светлых щеках черный завиток. На крыльях две светлые полосы.

Образ жизни. Населяет культурный ландшафт деревни, села, усадьбы, а также города. Гнезда устраивает в дуплах, в щелях домов и скворечниках. Кладки (до 3 за год) в апреле – июле из 4-8 яиц. Питается семенами, зерном, вишнями, насекомыми, пищевыми отходами. Многочисленный оседлый, широко распространенный вид.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Врановые – Corvidae

Род Вороны – Corvus

Вид **ВОРОН** – CORVUS CORAX

1 зал, витрина 11

Внешний вид. Величиной с домашнюю утку. Оперение черное с металлическим синеватым блеском. Хвост клиновидной формы.

Образ жизни. Населяет старые леса. Встречается и в крупных лесопарках, хотя и не тяготеет к соседству с человеком. Гнездо строит на дереве. Кладка из 3-7 яиц. Основная пища – мелкие грызуны, насекомые, падаль. Оседлый вид. Распространен повсеместно, обычен на всей территории, а в местах расположения крупных животноводческих комплексов со скотомогильниками бывает многочислен.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Врановые – Corvidae

Род Вороны – Corvus

Вид **ВОРОНА СЕРАЯ** – CORVUS CORNIX

2 зал, витрина 36

Внешний вид. Птица массой до 600 г. Оперение на спине и брюшке серое, на голове, горле, части груди, крыльях и хвосте черное.

Образ жизни. Населяет самые различные биотопы, но при этом явно тяготеет к антрополическому ландшафту. Стайная, в гнездовой период живет парами. Гнезда на деревьях. Кладка из 4-5 яиц. Всеядная, уничтожает вредных насекомых, подбирает падаль, отбросы. Многочисленный, оседлый вид, зимой кочует.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Синицевые – Paridae

Род Синица – Parus

Вид **ГАИЧКА ЧЕРНОГОЛОВАЯ – PARUS PALUSTRIS**

2 зал, витрина 36

Внешний вид. Мельче воробья. Спина, крылья и хвост буровато-серые. Верх головы и пятно под клювом черные.

Образ жизни. Населяет лиственные и смешанные леса, парки, сады. Гнездо строит в дупле. Кладка из 6-10 яиц. Питается разнообразными насекомыми, семенами. Обычный оседлый вид. Зимой держится стайками, часто кочует вместе с другими синицами.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Врановые – Corvidae

Род Вороны – Corvus

Вид **ГАЛКА** – CORVUS MONEDULA

1 зал, витрина 24

2 зал, витрина 16, 24, 34

3 зал, витрина 1

Внешний вид. Величиной с голубя. Оперение черное с металлическим блеском, верх головы и шеи серый. Радужная оболочка глаза светлая.

Образ жизни. Населяет города и поселки, рощи и парки. Держится стаями, часто вместе с воронами и грачами. Гнездится отдельными парами и колониями. Гнезда устраивает в дуплах, под крышами домов, в трубах. Кладка из 4-7 яиц. Питается животной и растительной пищей. Многочисленный, оседлый, частично перелетный вид.

Зимует в Центральной и Западной Европе.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Врановые – Corvidae

Род Вороны – Corvus

Вид **ГРАЧ** – CORVUS FRUGILEGUS

1 зал, витрина 23

2 зал, витрина 24, 33, 34

Внешний вид. Величиной с ворону. Окраска черная с синим металлическим отливом. У взрослых птиц вокруг клюва голая грязно-белая кожа.

Образ жизни. Типичный обитатель культурного ландшафта. Держится стаями, гнездится колониями. Гнезда устраивает на деревьях, часто по несколько на одном дереве. Кладка из 5-6 яиц. Питается насекомыми, мелкими грызунами. Перелетный, частично оседлый, широко распространенный на всей территории вид.

Зимует в Западной Европе.





## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Род Дрозд – Turdus

Вид **ДРОЗД ПЕВЧИЙ** – TURDUS PHILOMELOS

1 зал, витрина 46

Внешний вид. Величиной со скворца. Спинная сторона буровато-серая, брюшная белая, с многочисленными темными пестринами.

Образ жизни. Населяет различные типы леса. Гнездо на дереве или большом кусте. Кладка из 3-5 яиц. Кормится на земле. Обычный, широко распространенный перелетный вид.

Зимует в Западной и Южной Европе, Северной Африке.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Род Дрозд – Turdus

Вид **ДРОЗД-РЯБИННИК** – TURDUS PILARIS

1 зал, витрина 46

2 зал, витрина 36

Внешний вид. Немного крупнее скворца. Верх головы, шеи и надхвостье серые. Спина каштановая, грудь охристая, брюшко белое. На груди и боках крупные темные треугольные пестрины.

Образ жизни. Населяет опушки, перелески. Парки, сады, хвойные и лиственные леса. Держится стаями, гнездится обычно колониями. Гнездо строит на дереве или на кусте в виде чашки из сухой травы, веточек и земли. Кладка из 4-7 яиц. Питается насекомыми и их личинками, осенью и зимой ягодами. Многочисленный перелетный, пролетный и частично зимующий вид.

Зимует в Центральной и Южной Европе.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Род Дрозд – Turdus

Вид **ДРОЗД ЧЕРНЫЙ** – TURDUS MERULA

1 зал, витрина 156

Внешний вид. Немного крупнее скворца. Окраска самца сплошь черная. Клюв и веки оранжевые. Самка и молодые птицы буросерые с темным клювом.

Образ жизни. Населяет различные типы леса, преимущественно лиственные и смешанные, заросли кустарников, сады и парки. Гнездо строит на земле, кусте или на горизонтальной ветке дерева низко над землей. Кладка из 4-7 яиц. Питается насекомыми и их личинками. Обычный, широко распространенный перелетный и транзитно мигрирующий вид.

Зимует в южных районах ареала.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Род Дубонос – Coccothraustes

Вид **ДУБОНОС ОБЫКНОВЕННЫЙ** – COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES

3 зал, витрина 34

Внешний вид. Величиной со скворца. Оперение розовато-рыжее. Крылья, хвост и пятно на горле черные, середина спины и плечи коричневые, зашеек серый. Клюв толстый, массивный.

Образ жизни. Населяет лиственные и смешанные леса с примесью дуба и граба, с середины июля встречается в парках, садах. Гнездо строит на дереве. Кладка из 3-7 яиц. Питается семенами и плодами деревьев и кустарников, насекомыми. Перелетный и частично зимующий вид. Распространен неравномерно: в северных районах редок, в южных – обычен.

Зимует южнее 53° с. ш., частично на юге Беларуси.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Род Полевой жаворонок – Alauda

Вид **ЖАВОРОНОК ПОЛЕВОЙ** – ALAUDA ARVENSIS

1 зал, витрина 7

Внешний вид. Немного крупнее воробья. Верх тела охристый, серовато-бурый с широкими продольными бурыми пестринами, низ охристо-беловатый с бурыми пестринами на груди. На голове заметный широкий хохолок.

Образ жизни. Населяет открытые пространства поля, луга, вырубки и даже частично мелиорированные верховые болота. Гнездо устраивает на земле в ямке или в углублении. Кладка из 4-5 яиц. Питается насекомыми, семенами растений. Обычный, широко распространенный, перелетный вид.

Зимует в Западной Европе.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Род Рогатый жаворонок – Eremophila

Вид **ЖАВОРОНОК РОГАТЫЙ** – EREMOPHILA ALPESTRIS

1 зал, витрина 7

Внешний вид. Крупнее воробья. Верхняя сторона тела розовато-серая. Низ белый. Через глаз к уху и поперек зоба черные полосы. По бокам головы торчат черные перья «рожки».

Образ жизни. В Беларуси как немногочисленная птица регулярно бывает на пролетах весной (в марте – апреле) и осенью (в конце октября – ноября). Питается мелкими беспозвоночными и семенами растений.

Зимует в Западной Европе.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Род Зарянка – Erithacus

Вид **ЗАРЯНКА** – ERITHACUS RUBECULA

1 зал, витрина 16

Внешний вид. Немного мельче воробья. Верх тела оливково-серый, брюшко белое, горло и грудь оранжевые. Молодые птицы бурые со светлыми пестринами.

Образ жизни. Населяет различные типы леса. Гнездо на земле, в прогнившем пеньке, реже в дупле. Кладка дважды за год из 5-6 яиц. Питается преимущественно насекомыми, в конце лета ягодами. Обычный перелетный, широко распространенный вид.

Зимует в Западной Европе, Малой Азии.





## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Род Зеленушка – Chloris

Вид **ЗЕЛЕНУШКА** – CHLORIS CHLORIS

1 зал, витрина 24

Внешний вид. Величиной с воробья. Окраска самца желто-зеленая. Самка серовато-зеленоватая.

Образ жизни. Населяет разреженные леса, сады и парки. Гнездо строит на деревьях и кустах. Кладка в апреле из 5-6 яиц. Питается насекомыми, семенами, ягодами. Обычный перелетный, на юге частично оседлый, широко распространенный вид.

Зимует в южной части страны.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Врановые – Corvidae

Род Кедровка – Nucifraga

Вид **КЕДРОВКА** (ОРЕХОВКА) – NUCIFRAGA CARYOCATACTES

1 зал, витрина 46

Внешний вид. Величиной с голубя. Оперение каштаново-бурое с многочисленными белыми перышками. Клюв довольно длинный.

Образ жизни. Населяет преимущественно хвойные леса, явно предпочитая ельники. Гнездо помещается на дереве. Кладка в апреле из 2-6 яиц. Питается семенами ели, сосны, дуба, насекомыми, мелкими грызунами. Разносит и прячет в лесную подстилку желуди, чем способствует распространению дуба. Весьма редкий оседлый вид. Значительно чаще встречается в северной и северо-восточной частях республики.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Корольковые – Regulidae

Род Королек – Regulus

Вид **КОРОЛЕК ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ** – REGULUS REGULUS

1 зал, витрина 15

Внешний вид. Самая маленькая птица нашей страны (масса 5-7 г). Оперение пушистое, верх тела оливково-зеленый, низ светлый, на крыльях две беловатые поперечные полосы. Голова желтая с двумя черными полосками.

Образ жизни. Населяет старые ельники и елово-сосновые леса. Шароподобное гнездо строит высоко на елях. Кладка дважды за год (в мае и июле) из 8-10 яиц. Питается мелкими насекомыми, пауками, семенами ели и сосны. Оседлый, распространен повсеместно. Осенью и зимой кочует.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Синицевые – Paridae

Род Синица – Parus

Вид **ЛАЗОРЕВКА** – PARUS COERULEUS

1 зал, витрина 13

2 зал, витрина 16, 36

Внешний вид. Мельче воробья. «Шапочка» на голове, крылья и хвост голубые. Спина зеленая, лоб и щеки белые, грудь и брюшко желтые.

Образ жизни. Населяет лиственные леса, сады и парки. Гнездо устраивает в дупле. Кладка из 5-10 яиц. Питается насекомыми, семенами. Обычный оседлый, широко распространенный вид.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Ласточковые – Hirundinidae

Род Касатка – Hirundo

Вид **ЛАСТОЧКА ДЕРЕВЕНСКАЯ** (КАСАТКА) – HIRUNDO RUSTICA

1 зал, витрина 16

2 зал, витрина 15, 21

Внешний вид. Величиной с воробья. Верх тела сине-черный, низ белый. Лоб и горло ржаво-коричневые. Хвост длинный, раздвоенный.

Образ жизни. Обитает в культурном ландшафте, вблизи поселков и городов. Гнездо «чашечка», слеплено из комочков глины и помещается под крышей зданий. Кладка из 4-6 яиц. Питается насекомыми. Обычный перелетный, широко распространенный вид.

Зимует в Африке.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Овсянковые – Emberizidae

Род Овсянка – Emberiza

Вид **ОВСЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ** – EMBERIZA CITRINELLA

1 зал, витрина 7

Внешний вид. Величиной с воробья. У самца оперение преимущественно желтое. Голова, горло, грудь и брюшко желтые с редкими темными пятнами. Спина и бока коричневые, крылья и хвост бурые. У самки оперение грязно-желтое.

Образ жизни. Населяет кустарники среди полей, опушки, перелески, реже сады и парки. Гнездо на земле. Кладка из 4-6 яиц. Питается семенами растений, насекомыми. Обычный оседлый, широко распространенный вид.

Большинство улетает на юг республики в конце сентября, октября.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Пищуховые – Certhiidae

Род Пищуха – Certhia

Вид **ПИЩУХА ОБЫКНОВЕННАЯ** – CERTHIA FAMILIARIS

1 зал, витрина 15

Внешний вид. Немного мельче воробья. Оперение спины серовато-бурое с белыми пестринами, брюшко шелковисто-белое. Клюв тонкий, длинный, загнутый вниз.

Образ жизни. Населяет сосновые и смешанные леса. Лазает по стволу дерева по спирали вверх, опираясь на твердый хвост. Гнездо строит в дупле или за отставшей корой. Кладка дважды за год (в мае и июне) из 5-8 яиц. Питается насекомыми и их личинками, осенью и зимой частично семенами. Обычный оседлый, широко распространенный вид.





## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Поползневые – Sittidae

Род Поползень – Sitta

Вид **ПОПОЛЗЕНЬ** – SITTA EUROPAEA

1 зал, витрина 15

Внешний вид. Величиной с воробья. Оперение спины голубовато-серое, брюшко белое или охристое с коричневыми боками. Над глазами и на лбу белая полоса, от клюва через глаз проходит черная полоса. Клюв длинный, прямой, прочный.

Образ жизни. Населяет лиственные и смешанные леса. Осенью и зимой залетает в парки, скверы, сады. Хорошо лазит по стволам деревьев как вверх, так и вниз головой. Гнездо помещается в дупле, вход в него обмазан глиной. Кладка из 6-8 яиц. Питается насекомыми и их личинками, семенами деревьев и кустарников. Обычный оседлый, широко распространенный вид.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Свиристелевые – Bombycillidae

Род Свиристель – Bombycilla

Вид **СВИРИСТЕЛЬ** – BOMBYCILLA GARRULUS

1 зал, витрина 46

Внешний вид. Величиной со скворца. Оперение розовато-серое. На крыльях узкие желтые и широкие белые полосы и красные роговые пластинки. На голове большой хохол. На хвосте поперечная желтая полоса.

Образ жизни. Встречается на весеннем (апрель) и осеннем (ноябрь) пролетах. В небольшом количестве зимует. Держится в лесах, где много рябины, шиповника, вблизи жилья.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Синицевые – Paridae

Род Синица – Parus

Вид **СИНИЦА БОЛЬШАЯ** – PARUS MAJOR

1 зал, витрина 13

2 зал, витрина 16, 36

Внешний вид. Величиной с воробья. Голова, горло, полоса посреди груди и подхвостье черные, спина голубовато-серая, низ желтый или белый. Крылья и хвост голубоватые.

Образ жизни. Населяет лиственные и смешанные леса, парки, сады, населенные пункты. Гнездо в дуплах, щелях зданий. Кладка дважды за год из 9-13 яиц. Питается насекомыми, в зимний период частично семенами. Обычный оседлый, широко распространенный вид.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Длиннохвостые синицы – Aegithalidae

Род Длиннохвостая синица – Aegithalos

Вид **СИНИЦА ДЛИННОХВОСТАЯ – AEGITHALOS CAUDATUS**

2 зал, витрина 32

Внешний вид. Мельче воробья. Оперение пушистое. Хвост длинный, ступенчатый. Спина, крылья и хвост черные, бока грязно-розовые. Голова и брюшко белые.

Образ жизни. Населяет преимущественно сырые смешанные и лиственные леса. Гнездо помещается в развилке ствола или куста, шарообразное с боковым входом. Кладка из 10-12 яиц. Питается мелкими насекомыми и их личинками. Обычный оседлый, широко распространенный вид.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Скорцовые – Sturnidae

Род Настоящий скворец – Sturnus

Вид **СКВОРЕЦ** – STURNUS VULGARIS

1 зал, витрина 23

2 зал, витрина 37

Внешний вид. Птица массой до 80 г. Оперение черное с зеленовато-синим или фиолетовым металлическим блеском и светлыми пестринами. У молодых птиц оперение темно-бурое.

Образ жизни. Населяет культурный ландшафт, разреженные леса. Прилетает в начале марта. Гнездо делает в скворечниках, дуплянках, дуплах деревьев. Кладка дважды за год (в конце марта – апреля и в мае – июне) из 5-7 яиц. Питается на земле разнообразными насекомыми, червями, ягодами. Вид перелётный, распространен повсеместно.

Зимует в Западной Европе, Африке.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Славковые – Sylviidae

Род Славка – Sylvia

Вид **СЛАВКА ЧЕРНОГОЛОВАЯ** – SYLVIA ATRICAPILLA

1 зал, витрина 24

Внешний вид. Мельче воробья. Подвижная стройная с тонким шиловидным клювом и мягким буровато-серовато-оливковым оперением. У самца на голове черная «шапочка», у самки и молодых птиц она рыжевато-коричневая.

Образ жизни. Населяет светлые смешанные и лиственные леса, перелески, парки, сады. Гнездо рыхлое на кустах, молодых елочках. Кладка из 4-6 яиц. Питается насекомыми и их личинками, в послегнездовой период ягодами. Обычный перелетный, широко распространенный вид.

Зимует в странах Средиземноморья.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Род Снегирь – Pyrrhula

Вид **СНЕГИРЬ** – PYRRHULA PYRRHULA

1 зал, витрина 13

2 зал, витрина 36

Внешний вид. Величиной с воробья. У самца «шапочка» на голове, крылья и хвост черные, спина голубовато-серая. Низ розовато-красный. Оперение около хвоста и полоска на крыле белая. Клюв массивный. Самка не такая яркая, буровато-серая.

Образ жизни. Обитает в еловых и смешанных лесах, во время осенних и зимних кочевок посещает сады и парки. Гнездо строит на молодых елях. Кладка (в мае – начале июня) из 4-7 яиц. Питается семенами трав, почками, ягодами. Немногочисленный гнездящийся (преимущественно в северных районах) вид, зимой многочисленный пролетный и кочующий, встречается повсеместно.





## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Род Соловей – Luscinia

Вид **СОЛОВЕЙ** – LUSCINIA LUSCINIA

2 зал, витрина 32

Внешний вид. Величиной с воробья. Оперение оливково-бурое, надхвостье рыжее.

Образ жизни. Населяет кустарниковые заросли в лиственных лесах, садах и рощах вблизи воды или в сырых местах. Осторожен, держится скрытно. В брачный период поет почти всю ночь и днем. Гнездо на земле. Кладка (в мае – начале июня) из 4-5 яиц. Питается жуками, клопами, гусеницами, мухами, осенью – ягодами. Обычный перелетный вид.

Зимует в тропической части Африки.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Врановые – Corvidae

Род Сойка – Garrulus

Вид **СОЙКА** – GARRULUS GLANDARIUS

1 зал, витрина 42, 46

3 зал, витрина 3, 34

Внешний вид. Величиной с голубя. Оперение пушистое, рыхлое. На голове широкий хохол. Крылья и хвост черные, надхвостье белое, остальное оперение коричнево-серое. На крыльях ярко-голубые с черными полосками перья.

Образ жизни. Населяет лиственные и смешанные леса. Гнездо на дереве. Кладка (в апреле – мае) из 5-7 яиц. Питается желудями, орехами, ягодами. На зиму прячет желуди в лесную подстилку и мох, что содействует распространению дуба. Обычный оседлый и кочующий вид.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Врановые – Corvidae

Род Сорока – Pica

Вид **СОРОКА** – PICA PICA

1 зал, витрина 43

2 зал, витрина 35

3 зал, витрина 31

Внешний вид. Величиной с галку. Оперение черно-белое, хвост длинный, ступенчатый. Брюшко и плечи белые, остальная часть тела черная.

Образ жизни. Населяет древесные и кустарниковые насаждения в различных ландшафтах. Осторожная, сообразительная птица. Гнездо с крышей устраивает на кустах или на дереве. Кладка в апреле из 5-9 яиц. Питается насекомыми, яйцами и птенцами мелких птиц, пищевыми отходами. Многочисленный оседлый, зимой кочующий вид.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Род Сорокопут – Lanius

Вид **СОРОКОПУТ-ЖУЛАН** – LANIUS COLLURIO

3 зал, витрина 34

Внешний вид. Немного крупнее воробья. У самца верх рыжий, хвост, крылья и полосы через глаза черные, голова и шея черные. У самки верх охристо-коричневый, низ грязно-белый с чешуйчатым темным рисунком. Клюв сильный с острым, загнутым концом.

Образ жизни. Населяет заросли кустов в открытых ландшафтах, сады, парки. Гнездо на дереве или кусте. Кладка из 4-7 яиц. Питается насекомыми и мелкими беспозвоночными. Наиболее распространенный, перелетный вид.

Зимует в Африке.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Род Сорокопут – Lanius

Вид **СОРОКОПУТ СЕРЫЙ** – LANIUS EXCUBITOR

3 зал, витрина 34

Внешний вид. Величиной со скворца. Оперение головы, спины и надхвостья пепельно-серые, низ белый. Крылья и хвост, черные с белыми отметинами. Клюв сильный, на конце крючкообразно загнутый.

Образ жизни. Населяет кустарники на открытых ландшафтах, опушки лесов. Гнездо на дереве или кусте. Кладка из 5-6 яиц. Питается грызунами, ящерицами, лягушками, насекомыми. Редкий гнездящийся и пролетный вид.

♦ Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Род Чечетка – Acanthis

Вид **ЧЕЧЕТКА** – ACANTHIS FLAMMEA

1 зал, витрина 13

2 зал, витрина 32

Внешний вид. Значительно меньше воробья (масса 10-15 г). Окраска верха серовато-бурая с продольными темными пестринами. Низ белый с темными пестринами на боках. На голове малиновая «шапочка». Горло черное. У самца грудь ярко-малиновая.

Образ жизни. Встречается на пролетах и в период зимних кочевков. Стаи появляются в октябре и исчезают в марте. Держится светлых лиственных лесов, пустошей, вдоль дорог, в парках. Питается семенами растений.



## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Род Чиж – Spinus

Вид **ЧИЖ** – SPINUS SPINUS

2 зал, витрина 32

Внешний вид. Очень мелкая птица (масса 11-14 г). Оперение самца желтовато-зеленое. «Шапочка» на голове, пятно под клювом, крылья и хвост черные. У самки оперение зеленовато-серое.

Образ жизни. Населяет смешанные леса (чаще еловые). Гнездо строит на елях, реже на соснах и березах. Кладка (в апреле – мае) из 5-6 яиц. Питается семенами деревьев, трав, насекомыми. Пролетный, перелетный и частично оседло-кочующий вид. Осенний массовый пролет в октябре. Встречается спорадически, чаще в северной части страны.





## Отряд Воробьинообразные Passeriformes

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Род Щеглы – Carduelis

Вид **ЩЕГОЛ ЧЕРНОГОЛОВЫЙ** – CARDUELIS CARDUELIS

2 зал, витрина 32, 36

Внешний вид. Величиной с воробья. Оперение яркое, пестрое. Около острого длинного клюва широкая красная «маска». Крылья черные с широкой желтой полосой. Молодые без красной «маски» с пестринами на спине и груди.

Образ жизни. Населяет парки, сады, рощи. Гнездо на ветвях деревьев и кустов. Первая кладка в мае из 4-6 яиц, вторая в конце июля. Питается семенами трав, насекомыми. Обычный оседлый вид. Осенью собирается в стайки, зимой кочует вблизи мест гнездования или в более южных районах.



# ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

**Беспозвоночные животные** – животные не имеющие внутреннего скелета (моллюски, черви, насекомые и т.д.)

**Вид** – это совокупность особей сходных по внешнему и внутреннему строению, свободно скрещивающиеся и дающие плодовитое потомство.

**Двойное дыхание** – механизм дыхания птиц в полете с использованием легких и воздушных мешков.

**Моногам** – единобрачие, когда самец в течение нескольких сезонов образует пару с одной и той же самкой и принимает участие в заботе о потомстве.

**Обмен веществ** – процесс превращения веществ в живой материи, лежащий в основе жизни.

**Орнитофауна** – часть животного мира представленная птицами.

**Оседлый вид** – вид птиц, постоянно обитающий на определенной территории.

**Перелетный вид** – вид птиц, совершающий осенние и весенние миграции.

**Позвоночные животные** – животные, имеющие внутренний скелет (рыбы, птицы и т.д.)

**Полигам** – Многобрачие, один самец за период размножения образует пары с несколькими самками.

**Пролетный вид** – вид птиц, который во время миграций пролетает над определенной территорией.

**Теплокровные животные** – животные, имеющие постоянную температуру тела, не зависящую от условий окружающей среды.

**Фауна** – животный мир (совокупность всех видов животных)

**Флора** – растительный мир (совокупность всех видов растений)

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бёме Р.Л. Птицы открытых околородных пространств СССР. – М.: Просвещение, 1983.
2. Бышнев И.И. Птицы над Березиной. – Минск.: Ураджай, 1993.
3. Дементьев Г.П. Птицы СССР. – М.: Мысль, 1968.
4. Дорофеев А.М. Птушкі. – Мінск: Народная асвета, 1984.
5. Иванова Т.В., Свиридова Г.Л. Большой справочник по биологии. – М.: Астрель, Олимп, 2000.
6. Никифоров М.Е. Птицы Белоруссии. – Минск: Высшая школа, 1989.
7. Пашков Г.П. Красная Книга Республики Беларусь. – Минск: Белорусская энциклопедия, 2004.
8. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия. – М.: Просвещение, 1988.
9. Храбрый В.М. Атлас определитель птиц. – М.: Просвещение, 1988.
10. Шамякин И.П. Природа Белоруссии. – Минск: Белорусская энциклопедия, 1986.



НПІКМЗ  
Полоцк 2007